

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
Drogambulancia

Dizájner drogok



Dr. Szalayné Péter Ildikó

Dizájner drogok

A dizájner drogok „törvénykerülő” drogok, olyan vegyületek, amelyeket a kábítószerlistán szereplő tiltott anyagok apró változtatásaival állítanak elő.

A dizájner drogokat többnyire nem emberi fogyasztásra szánt termékként –növényi tápsóként, fürdősóként, füstölőként, ajándék tárgyként- árusítják speciális boltokban vagy az interneten.

4-MMC (mefedron)

A 2010-es nyár egyik legnépszerűbb kábítószere a mefedron, amely -„Zsuzsi”, „Kati”, „Mefisztó” és „Kristály”-fantázianeveken ismert.

A mefedron-t 2011. január 1.-től tiltólistára helyezték.

Növény-növekedést serkentő anyagokban, valamint porszívó illatosítóban található meg.

A mefedron a serkentő pszichoaktív szerek közé sorolható, hatása nagyon hasonlít az amfetaminokéhoz, főleg az extasy-hoz.

MEGJELENÉSE:

- ❖ Fehér por
- ❖ Kristály
- ❖ Olyan kapszula, amely a port tartalmazza
- ❖ Tabletta
- ❖ Folyadék

Erős, átható vegyszer szaga van.

Használat módja:

- ❖ Szájon át
- ❖ Orrba felszippantva
- ❖ Intravénásan



Rövid távú hatásai:

- ❖ kis adagban kellemes közérzet
- ❖ fokozódó eufória
- ❖ izgalmi állapot, ingerlékenység
- ❖ nyugtalanság, feldobottság
- ❖ fokozott nemi vágy
- ❖ beszédkénszer
- ❖ túlzott nyitottság
- ❖ erőszakos cselekmények, öncsonkítás

Különösen veszélyes alkohollal együtt
fogyasztva!

Hosszú távú hatásai:

Hosszú távú hatásai még kevésbé ismertek, mivel a szert nemrég kezdték el használni.



Rendszeres fogyasztása:

- ✓ Hallucinációkat,
- ✓ nyugtalanságot
- ✓ ingerlékenységet,
- ✓ fokozott izgalmi (mániás) állapotot okoz.



Egyéb hatásai:

- Hallucináció
- Vérkeringési problémák
- Orrvérzés
- Tartós ok nélküli aggodalom
- Kiütések
- Rövidtávú memória károsodás
- Paranoia
- Koncentrációs készség gyengülés
- Szapora szívverés
- Depresszió
- Izzadás
- Fogcsikorgatás



Túladagolás

Veszélye nagy, akár hirtelen bekövetkező szívhalált is okozhat!

Hozzászokás

Pár nap alatt, illetve az első alkalom után is kialakulhat, akár napi 15-30 alkalommal is szúrnak.

Fertőzésveszély

Gyakori a közös tűhasználat, ezért a HIV/AIDS, Hepatitisz B/C vírus fertőzések valószínűsége jelentősen megnő.

Betegek beszámolói

A 20-30 percig tartó flash után mérhetetlen űr, depresszió, sóvárgás alakul ki a szer után, ami arra sarkallja, hogy újra használja a mefedront.

Gyakran panaszkodnak hallucinációkra, agresszív viselkedésre, öngyilkossági gondolatokra, feszültségre, idegességre, alvászavarra, étvágytalanságra, nagymértékű fogyásra, szív táji fájdalomra, végtagzsibbadásra, remegésre, csontfájdalmakra, az intravénás használat miatt vénagyulladásokra.

A kábítószeres feketepiacának kb.45%-át a dizájner drogok uralják, háttérbe szorítva az amfetaminokat.



Európában a megnevezett másik dizájner drogot tartanak számon, míg pl.: Japánban 51 változata ismert.

MDPV - Methylenedioxypropylvalerone

Az MDPV egy pszichoaktív stimuláns, amit 2004 óta árulnak, mint kísérleti vegyi anyagot.



Az MDPV-t 2010-ben Amerikában fürdőszóként kezdték el használni.

Természetesen nem minden fürdőszó tartalmazza ezeket az anyagokat.



Megjelenése:

Az MDPV tiszta világosbarna, éles szagú por.

Ha fénynek teszik ki: barnulni kezd; és szaga is megbarnult krumpliéra emlékeztet.



Hatása:

- Kokainéhoz és az amfetaminéhoz hasonlít.
- Pulzusszám emelkedés, gyors szívverés.
- Éberség, izgatottság, izzadás.


Az akut tünetek 3-4 órán keresztül tartanak.

Majd nagyjából 4 órán keresztül:

- Heves szívdobogás
- Magasvérnyomás
- Mérsékelt éberség

Nagy dózisú használata:

- Intenzív, hosszú lefolyású pánikroham.
- Pszichózis : (alvásmegvonás miatt)
- Függőség



Az MDPV különösen erős vágykeltő hatással rendelkezik

Elvonási tünetek:


- Depresszió
- Levertség
- Fejfájás
- Izgatottság
- Izomgyengeség
- Szembevérzés
- Vese fájdalom



Gina

-Íztelen, színtelen, szagtalan szer, melyből pár csepp is elég ahhoz, hogy tíz perc alatt szédülést, ájulást, tudatkiesést okozzon.

-GHB-ként, GBL-ként, Ginaként, gammaként ,randi- drogként, vagy folyékony extasyként emlegetik.



- A GHB-t korábban gyerekek altatására használták az orvosok.
- Ha megisszák 10-15 perc múlva tudatvesztés és légzészavar lép fel. Túladagolás esetén pedig légzési elégtelenség, kóma.
- Az elkövetők kifosztás és nemi erőszak céljából rakják a kiszemelt italába a szert.
- A szer mindössze 12 órán keresztül mutatható ki a vizeletből. Utóhatásai pedig nincsenek.

- A rövid távú emlékezetet roncsoló hatása miatt használják bűncselekményekhez.
- A GHB-vel elkábított lányokat gyakorta erőszakolnak meg. Az áldozatok sokszor önként elmennek az elkövetőkkel, mert teljesen elveszítik az öntudatukat. Később egyáltalán nem emlékeznek arra, ami történt velük.
- Általában alkoholba keverik, ami még inkább felerősíti a hatását.



Látnokzsálya- Jósmenta

Dél- Mexikóban honos növényfaj.

Magyarországon a látnokzsálya, és hatóanyagai nem szerepelnek a kábítószernek minősülő anyagok listáján.

A növényvel leginkább virágboltokban találkozhatunk, mert dísznövényként árulják.





Fogyasztása:


- Levelét pipából, vagy vízpipából szívják.
- Előfordul, hogy élvezői megrágják és lenyelik.
- Egy józan vigyázó segítsége szükséges!

Veszélyei:

- Hatása alatt nem tanácsos autót vezetni.
- Azoknál akiknek a családjában előfordult skizofrénia, vagy mentális zavar, különösen ajánlott az óvatosság, mert felszínre hozhatják a lappangó pszichés- és mentális zavarokat.

Hatásai:

- Salvia trip alatt fokozott verítékezés, testhőmérséklet- növekedés tapasztalható.
- A fogyasztás után fejfájás, ingerlékenység jöhet létre.



Legálzöld

Szárított gyógynövényekből készült, utólag aromákkal kezelt illatosító, füstölő.

Szlengnevek: herbál, diamond, tiplax, sámán, zafír, jamaican gold

Kristálymet

Kristálymet fogyasztása súlyos emlékezetkieséssel, agresszióval, pszichotikus viselkedéssel, szív- és agykárosodással jár.

A kristálymet olyan pusztító sóvárgást alakít ki, amelyet csak még több drog fogyasztásával lehet enyhíteni.

Fogyasztója már az első használat után függővé válhat tőle.

Ez az egyik legkeményebb, legnehezebben kezelhető drogfüggőség, mely gyakran halált okoz.

Szlengnevek: ice, jég, forró jég, kristály, üveg, amfeco, Tina, fecske, kvarc, rezsó, amfóra, penge, kristályüveg